

BIONECT®

Plus Krém

Popis produktu

BIONECT PLUS - krém je zevní přípravek tvořený sodnou solí kyseliny hyaluronové jako hlavní složkou. Kyselina hyaluronová je biologický polysacharid (glykosaminoglykan) nacházející se v mimobuněčném pojivu většiny tkání. Několik studií zdokumentovalo, že se může účastnit mnoha různých procesů tkáňové opravy usnadňujících hojení a re-epitelizaci. Díky svým hydrofilním vlastnostem poskytuje vlhké prostředí pro rány nezbytné pro přirozený proces hojení. Sulfadiazin stříbrný je dobře známá antimikrobiální látka inhibující růst in vitro téměř všech patogenních bakterií a hub. Přítomnost sulfadiazinu stříbrného ve složení produktu hraje roli při prevenci mikrobiální kontaminace, čímž zlepšuje schopnost kyseliny hyaluronové podporovat hojení ran. Tyto vlastnosti umožňují měnit obzav pouze jednou denně: to způsobuje minimální nepohodlí pro pacienta a minimální vystavení léze vzduchu, čímž se snižuje možnost kontaminace rány.

Složení

Hlavní složka: Sodná sůl kyseliny hyaluronové 0,2%
Další složky: Sulfadiazin stříbrný 1%, polyetylen glykol 400 monostearát, decylester kyseliny olejové, emulgační vosk, glycerol, roztok sorbitolu 70%, čištěná voda.

Indikace

Přípravek BIONECT PLUS je určen k léčbě kožních lézí, zejména těch s vysokým rizikem infekce. Je určen převážně k pokrytí akutních a chronických ran (popáleniny prvního a druhého stupně, vaskulární a metabolické vředy a otlaky) a poskytnutí vlhkého prostředí bez mikrobu. BIONECT PLUS lze použít na neinfikované rány k prevenci infekce a po úspěšné léčbě infikovaných ran k prevenci opětovného výskytu infekce.

Dávkování a podání

Léze by měly být očištěny před každou aplikací. Nanášejte tenkou vrstvu krému na povrch rány, jednou nebo dvakrát denně, v závislosti na závažnosti, dokud nedojde k úplnému uzdravení. Proloužená léčba po dobu jednoho měsíce by měla být posouzena lékařem na základě klinického vývoje léze. Ošetřená oblast by měla být zakryta sterilním obvazem.

Kontraindikace

Nepodávejte pacientům se zjištěnou individuální přecitlivělostí na složky přípravku nebo se selháním jater nebo ledvin nebo s nedostatkem glukózy-6-fosfát dehydrogenázy. Nepodávat těhotným ženám a dětem.

Varování a bezpečnostní opatření

Nepoužívejte v případě poškození obalu. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum expirace se vztahuje na produkt uchovávaný v původním obalu při teplotě pod 30 ° C.

Zlikvidujte po 12 měsících od prvního otevření. Po použití zlikvidujte podle platné národní praxe. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vyvarujte se přímého kontaktu nádoby s ránou. Každou tubu krému BIONECT PLUS Cream by měl používat pouze jeden pacient, aby se snížilo riziko křížové infekce. Vyvarujte se vystavení ošetřovaných oblastí slunečnímu záření, protože výrobky obsahující sulfadiazin stříbrný mohou na kůži způsobovat nahnědlé skvrny. Jakékoli skvrny však lze snadno odstranit omytím oblastí.

Interakce

Nepoužívejte souběžně s dezinfekčními prostředky obsahujícími kvartérní amoniové soli nebo s lokálně aplikovanými proteolytickými enzymy, protože se mohou vzájemně ovlivňovat s produktem.

Nežádoucí účinky

BIONECT PLUS je obvykle dobře tolerován. Při léčbě rozsáhlých částí těla se mohou vyskytnout vedlejší účinky, které se někdy pozorují po systémovém podání sulfonamidů, jako je selhání ledvin, toxická hepatitida, agranulocytóza, trombocytopenie, leukopenie.

Skladování


Uchovávejte při teplotě do 30 ° C
Chraňte před mrazem.

Jak je produkt dodáván
Kartonová krabička obsahující jednu 25 g tubu
Kartonová krabička obsahující jednu 100 g tubu

Výrobce

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua) Italy

Datum poslední revize návodu k použití: březen 2016



BIONECT®

Plus Krém

Opis produktu

Krém BIONECT PLUS je prípravok, na lokálne použitie, ktorého hlavnou zložkou je sodná soľ kyseliny hyalurónovej. Kyselina hyalurónová je biologický polysacharid (glykozaminoglykán) distribuovaný v extracelulárnej matici väčšiny tkanív. Niekoľko štúdií zdokumentovalo, že sa môže podieľať na procesoch obnovenia mnohých rozmanitých tkanív, ktoré podporujú hojenie a opätovnú epitelizáciu. Vďaka svojim hydrofilným vlastnostiam poskytuje vlhké prostredie v ranách potrebné pre prirodzený proces hojenia. Sulfadiazín strieborný je známe antimikrobiálne činidlo, ktoré inhibuje rast takmer všetkých patogénnych baktérií a húb in vitro. Prítomnosť sulfadiazínu strieborného v zložení produktu má významnú úlohu pri prevencii mikrobiálnej kontaminácie, a tým zlepšuje schopnosť kyseliny hyalurónovej podporovať hojenie rán. Tieto vlastnosti umožňujú meniť obväz dokonca iba raz denne, čo predstavuje pre pacienta minimálne nepohodlie a minimálne vystavenie lézie vzduchu, čím sa znižuje možnosť kontaminácie rany.

Zloženie

Hlavná zložka: sodná soľ kyseliny hyalurónovej 0,2 %
Ďalšie zložky: sulfadiazín strieborný 1 %, polyetylén glykol 400 monostearát, decylester kyseliny olejovej, emulgačný vosk, glycerol, roztok sorbitolu 70 %, čistená voda.

Indikácie

BIONECT PLUS je indikovaný na ošetrovanie kožných lézií, najmä lézií s vysokým rizikom infekcie. Je určený najmä na ošetrovanie akútnych a chronických rán (popáleniny prvého a druhého stupňa, vtedy vasculárneho a metabolického pôvodu a otlaky) a na zabezpečenie vlhkého prostredia rán bez mikrobov.

BIONECT PLUS sa môže použiť na neinfikované rany na prevenciu infekcie a po úspešnej liečbe infikovaných rán na prevenciu opakovaného výskytu infekcie.

Dávkovanie a spôsob podania

Lézie by sa mali pred každou aplikáciou očistiť. Naneste raz alebo dvakrát denne tenkú vrstvu krému na povrch rany v závislosti od závažnosti, kým nedôjde k úplnému uzdraveniu. Dlhodobú liečbu trvajúcu dlhšie ako mesiac by mal lekár posúdiť na základe klinického vývoja lézie. Ošetrovaná oblasť by mala byť zakrytá sterilným obväzom.

Kontraindikácie

Nepodávajte pacientom so zistenou individuálnou precitlivosťou na zložky produktu alebo so zlyhaním pečene alebo obličiek alebo s nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

Nepodávajte tehotným ženám a deťom.

Upozornenia a opatrenia

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Nepoužívajte produkt po dátume expirácie uvedenom na obale.

Dátum expirácie sa vzťahuje na výrobok uchovávaný v pôvodnom obale pri teplote pod 30°C.

Zlikvidujte do 12 mesiacoch od prvého otvorenia.

Po použití zlikvidujte podľa platnej vnútroštátnej praxe.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Vyvarujte sa priameho kontaktu tuby s ranou.

Každú tubu krému BIONECT PLUS by mal používať iba jeden pacient, aby sa znížilo riziko krížovej infekcie.

Vyvarujte sa vystaveniu ošetrovaných oblastí slnečnému žiareniu, pretože produkty obsahujúce sulfadiazín strieborný môžu zafarbiť pokožku do hnedosiva. Akékoľvek škvrny však možno ľahko odstrániť umytím miesta, kde sa nachádzajú.

Interakcie

Nepoužívajte zároveň s dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi kvartérne amóniové soli alebo lokálne aplikované proteolytické enzýmy, pretože môžu reagovať s produktom.

Nežiaduce účinky

BIONECT PLUS sa zvyčajne dobre znáša. Pri liečbe rozsiahlych častí tela sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sa niekedy pozorujú po systémovom podaní sulfonamidov, ako je zlyhanie obličiek, toxická hepatitída, agranulocytóza, trombocytopenia, leukopénia.

Skladovanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C
Nezmrazujte.


Spôsob dodania

Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 25 g tubu
Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 100 g tubu

Výrobca

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padova) Taliansko

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: marec 2016



33001016/A

